

**PER QUÈ
ESTERILITZAR
EL MEU GAT
ÉS UNA BONA
IDEA?**



 **Veteralia**

PER QUÈ ESTERILITZAR EL MEU GAT ÉS UNA BONA IDEA?

A partir de la maduresa sexual els gats mascles marquen el territori amb orina, "disparant" contra potes de mobles, cantonades de portes, parets...per deixar ben clar que els hi pertanyen i són el seu territori.

Beneficis d'esterilitzar el gat:

1. **Per evitar el marcatge a casa:** ens estalviarem la mala olor generada per la orina del gat a l'interior de casa.
2. **Per evitar les fugides causades pel zel de les gates:** un 60% dels gats esterilitzats deixa d'escapar-se i més d'un 90% ho fa menys i durant menys temps.
3. **Per eliminar el risc de transmissió de malalties infeccioses:** les baralles entre gats o el contacte directe amb els gats del carrer poden provocar el contagi de greus malalties infeccioses com ara la leucèmia felina, la immunodeficiència felina o la peritonitis infecciosa felina entre d'altres. Moltes d'aquestes malalties poden ser mortals.
4. **Per evitar accidents:** el fet de sortir al carrer afavoreix que els gats puguin patir atropellaments, atacs de gossos, caigudes, enverinaments, etc.
5. **Per reduir les baralles amb altres gats:** gran part de les ferides provocades per baralles s'infecten i provoquen abscessos de pus que cal intervenir quirúrgicament.
6. **Per reduir el contagi de paràsits:** el fet de sortir de casa comporta un alt risc de que el gat ens introdueixi a casa tot tipus de paràsits com ara puces, paparres, fongs i sarnes.



**Esterilitzar
el gat multiplica per dos
la seva esperança de vida**

Quan cal castrar al meu gat?

Abans que manifesti els comportaments de risc o comenci a marcar amb orina, és a dir, abans de la maduresa sexual del gat (dels 4 als 8 mesos d'edat).

Recomanacions després de l'esterilització:

- És **IMPRESINDIBLE** que el seu gat mengi una dieta específica per a gats castrats ja que existeix una tendència a engreixar-se després de la intervenció.
- Aquestes dietes també disminuïen el risc de formació de càlculs urinaris que poden provocar alteracions en la micció, obstruccions i infecció d'orina.

